

زيادة جابانتين أكتافيس وتقليل:

Upptrottning av Gabapentin Actavis och nedtrrottning av:

يبدأ العلاج بجرعة منخفضة، تزداد تدريجيًا خلال الأسابيع التالية وفقًا للتعليمات التي تلقيتها من طبيبك. وسيتم تقليل جرعة دواء الصرع الآخر في نفس الوقت أو بعد زيادة جرعة غابابنتيناكتافيس.

يوم عمل لتغيير الجرعة:
(Veckodag för ändring av dos)

تاريخ البدء:
(Startdatum)

		الزيادة Upptrottning							ص = صباحًا ظ = ظهرًا م = مساءً M = Morgon L = Lunch K = Kväll			
ضع علامة عند انتهاء الأسبوع	اليوم السابع (Dag 7)	اليوم السادس (Dag 6)	اليوم الخامس (Dag 5)	اليوم الرابع (Dag 4)	اليوم الثالث (Dag 3)	اليوم الثاني (Dag 2)	اليوم الأول (Dag 1)	الأسبوع الأول (Vecka 1)	الأسبوع الثاني (Vecka 2)	الأسبوع الثالث (Vecka 3)	الأسبوع الرابع (Vecka 4)	الأسبوع الخامس (Vecka 5)
<input type="checkbox"/>	ص ظ م (K) (L) (M)	ص ظ م (K) (L) (M)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)					
<input type="checkbox"/>	ص ظ م (K) (L) (M)	ص ظ م (K) (L) (M)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)					
<input type="checkbox"/>	ص ظ م (K) (L) (M)	ص ظ م (K) (L) (M)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)					
<input type="checkbox"/>	ص ظ م (K) (L) (M)	ص ظ م (K) (L) (M)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)					
<input type="checkbox"/>	ص ظ م (K) (L) (M)	ص ظ م (K) (L) (M)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)	مجم/كيسولة (mg/kapsel)					

يوم عمل لتغيير الجرعة:
(Veckodag för ändring av dos)

تاريخ البدء:
(Startdatum)

		تقليل الجرعة (Nedtrrottning)				تقليل الجرعة (Nedtrrottning)					
ضع علامة عند انتهاء الأسبوع	عدد الأقراص في كل حالة (Antal tabletter per tillfälle)	مساءً (Kväll)	صباحًا (Morgon)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الخامس (Vecka 5)	ضع علامة عند انتهاء الأسبوع	عدد الأقراص في كل حالة (Antal tabletter per tillfälle)	مساءً (Kväll)	صباحًا (Morgon)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الأول (Vecka 1)
<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الخامس (Vecka 5)	<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الأول (Vecka 1)
<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع السادس (Vecka 6)	<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الثاني (Vecka 2)
<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع السابع (Vecka 7)	<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الثالث (Vecka 3)
<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الثامن (Vecka 8)	<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الرابع (Vecka 4)

معلومات إضافية:
(Övrig information)

الهاتف:
(Telefon)

طبيبي:
(Min läkare)

الهاتف:
(Telefon)

ممرضتي:
(Min sjuksköterska)

ما الذي يتعين علي فعله إذا نسيت تناول الدواء؟

تجنب تناول كبسولات إضافية لتعويض جرعة فاتتة. إذا نسيت تناول دوائك استشر طبيبك بشأن كيفية الاستئناف. هذا مهم للغاية في حال مرور فترة ويلة منذ تناول آخر جرعة.

ما الذي يتعين علي فعله إذا تناولت جرعة كبيرة من الدواء؟

إذا تناولت جرعة كبيرة جدًا من جابانتين أكتافيس أو إذا تناول طفل هذا الدواء عن طريق الخطأ، يتعين عليك الاتصال على الفور بالطبيب أو الموظف بالمستشفى أو الموظف (بالصيدلية أو مركز معلومات السموم) للاتصال على رقم 112 للاستشارة والحصول على تقييم المخاطر.