زيادة جرعة ليفيتيراسيتام أكتافيس وتقليل:

Upptrappning av Levetiracetam Actavis och nedtrappning av:

.....

يبدأ العلاج بجرعة منخفضة، تزداد تدريجيًا خلال الأسابيع التالية وفقًا للتعليمات التي تلقيتها من طبيبك.
وسيتم تقليل جرعة دواء الصرع الآخر في نفس الوقت أو بعد زيادة جرعة لاموتريجيناكتافيس.

تاريخ البدء: ..... (Startdatum)

يوم عمل لتغيير الجرعة: ..... (Veckodag för ändring av dos)

الزيادة (Upptrappning)

		عدد الأقراص في كل حالة (Antal tabletter per tillfälle) صباحًا (Morgon)		مساءً (Kväll)		ضع علامة عندانتهاء الأسبوع
الأسبوع الأول (Vecka 1)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع الثاني (Vecka 2)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع الثالث (Vecka 3)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع الرابع (Vecka 4)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع الخامس (Vecka 5)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع السادس (Vecka 6)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع السابع (Vecka 7)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع الثامن (Vecka 8)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐

تاريخ البدء: ..... (Startdatum)

يوم عمل لتغيير الجرعة: ..... (Veckodag för ändring av dos)

تقليل الجرعة (Nedtrappning)

		عدد الأقراص في كل حالة (Antal tabletter per tillfälle) صباحًا (Morgon)		مساءً (Kväll)		ضع علامة عندانتهاء الأسبوع
الأسبوع الأول (Vecka 1)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع الثاني (Vecka 2)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع الثالث (Vecka 3)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع الرابع (Vecka 4)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع الخامس (Vecka 5)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع السادس (Vecka 6)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع السابع (Vecka 7)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐
الأسبوع الثامن (Vecka 8)	مجم/قرص (mg/tablett)	قطع (st.)		قطع (st.)		7 x أيام (x 7 dagar) ☐

معلومات إضافية: ..... (Övrig information)

طبيبي: ..... (Min läkare) الهاتف: ..... (Telefon)

ممرضتي: ..... (Min sjuksköterska) الهاتف: ..... (Telefon)

ما الذي يتعين علي فعله إذا نسيت تناول الدواء؟
اتصل بطبيبك إذا فاتتك جرعة واحدة أو أكثر. تجنب تناول جرعة مضاعفة لتعويض جرعة فائتة.

ما الذي يتعين علي فعله إذا تناولت جرعة كبيرة من الدواء؟
تتمثل الآثار الجانبية المحتملة عند تناول جرعة زائدة من ليفيتيراسيتاماكتافيس في الشعور بالنعاس والهياج والعدوانية ونقص الانتباه.
اتصل بطبيبك في حال تناولك أقراصًا أكثر من الموصوفة.

Actavis AB, Strandbergsgatan 61, 112 89 Stockholm, tel. 08-13 63 70, info@actavis.se