

جدول لزيادة جرعة توبيراميت أكتافيس

Schema för upptrappning av Topiramat Actavis

يبدأ العلاج بجرعة منخفضة، تزداد تدريجيًا خلال الأسابيع التالية وفقًا للتعليمات التي تلقيتها من طبيبك.

تاريخ البدء: يوم عمل لتغيير الجرعة:
(Startdatum) (Veckodag för ändring av dos)

الزيادة Upptäppning		عدد الأقراص في كل حالة (Antal tabletter per tillfälle)		ضع علامة عند انتهاء الأسبوع (Kryssa när veckan är över)	
		مساءً (kväll)	صباحًا (Morgon)		
<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الأول (Vecka 1)
<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الثاني (Vecka 2)
<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الثالث (Vecka 3)
<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الرابع (Vecka 4)
<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الخامس (Vecka 5)
<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع السادس (Vecka 6)
<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع السابع (Vecka 7)
<input type="checkbox"/>	7 أيام (x 7 dagar)	قطع (st.)	قطع (st.)	مجم/قرص (mg/tablett)	الأسبوع الثامن (Vecka 8)

معلومات إضافية:

(Övrig information)

الهاتف:

(Telefon)

طبيبي:

(Min läkare)

الهاتف:

(Telefon)

ممرضتي:

(Min sjuksköterska)

ما الذي يتعين علي فعله إذا تناولت جرعة كبيرة من الدواء؟

التمس المشورة على الفور في حال تناول جرعة كبيرة من توبيراميت أكتافيس. اصطحب حقيبة الدواء معك. قد تشعر بالنعاس أو التعب أو حركات غير طبيعية بالجسم أو مشكلات أثناء الوقوف والتحرك أو قد تشعر بدوار نظرًا لانخفاض ضغط الدم أو تشنجات أو ضربات قلب غير طبيعية.

ما الذي يتعين علي فعله إذا نسيت تناول الدواء؟

اتصل بطبيبك إذا فاتتك جرعة واحدة أو أكثر. تجنب تناول جرعة مضاعفة لتعويض جرعة فاتتة.