Upptrappning av Gabapentin Actavis och nedtrappning av:

Gabapentin Actavi: افزایش تدریجی و کاهش:

.....

درمان با دوز پایین شروع می شود، که بنا به دستورالعملی که از پزشک دریافت میکنید در هفته های بعد به تدریج افزایش می یابد. مصرف دیگر داروهای صرع همزمان با افزایش Gabapentin Actavis کاهش می یابد.

تاریخ شروع: ..... (Startdatum) روزهای هفته برای تغییر مقدار تجویزی [دوز]: ..... (Veckodag för ändring av dos)

افزایش تدریجی
Upptrappning

M = صبح L = ظهر E = شب
M=Morgon L=Lunch K=Kväll

	روز 1 (Dag 1)	روز 2 (Dag 2)	روز 3 (Dag 3)	روز 4 (Dag 4)	روز 5 (Dag 5)	روز 6 (Dag 6)	روز 7 (Dag 7)	با پایان یافتن هفته علامت بزنید
هفته 1 (Vecka 1) ..... میلیگرم/کپسول (mg/kapsel)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	☐
هفته 2 (Vecka 2) ..... میلیگرم/کپسول (mg/kapsel)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	☐
هفته 3 (Vecka 3) ..... میلیگرم/کپسول (mg/kapsel)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	☐
هفته 4 (Vecka 4) ..... میلیگرم/کپسول (mg/kapsel)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	☐
هفته 5 (Vecka 5) ..... میلیگرم/کپسول (mg/kapsel)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	E L M (K) (L) (M)	☐

تاریخ شروع: ..... (Startdatum) روزهای هفته برای تغییر مقدار تجویزی [دوز]: ..... (Veckodag för ändring av dos)

کاهش تدریجی
(Nedtrappning)

		تعداد قرص در هر نوبت (Antal tabletter per tillfälle) صبح (Morgon)	شب (Kväll)	با پایان یافتن هفته علامت بزنید
هفته 1 (Vecka 1)	..... میلیگرم/قرص (mg/tablett)	عدد. (st.)	عدد. (st.)	☐ 7 روز x (x 7 dagar)
هفته 2 (Vecka 2)	..... میلیگرم/قرص (mg/tablett)	عدد. (st.)	عدد. (st.)	☐ 7 روز x (x 7 dagar)
هفته 3 (Vecka 3)	..... میلیگرم/قرص (mg/tablett)	عدد. (st.)	عدد. (st.)	☐ 7 روز x (x 7 dagar)
هفته 4 (Vecka 4)	..... میلیگرم/قرص (mg/tablett)	عدد. (st.)	عدد. (st.)	☐ 7 روز x (x 7 dagar)
هفته 5 (Vecka 5)	..... میلیگرم/قرص (mg/tablett)	عدد. (st.)	عدد. (st.)	☐ 7 روز x (x 7 dagar)
هفته 6 (Vecka 6)	..... میلیگرم/قرص (mg/tablett)	عدد. (st.)	عدد. (st.)	☐ 7 روز x (x 7 dagar)
هفته 7 (Vecka 7)	..... میلیگرم/قرص (mg/tablett)	عدد. (st.)	عدد. (st.)	☐ 7 روز x (x 7 dagar)
هفته 8 (Vecka 8)	..... میلیگرم/قرص (mg/tablett)	عدد. (st.)	عدد. (st.)	☐ 7 روز x (x 7 dagar)

معلومات إضافية: ..... (Övrig information)

طبيبي: ..... (Min läkare) تلفن: ..... (Telefon)

ممرضتي: ..... (Min sjuksköterska) تلفن: ..... (Telefon)

اگر بیش از حد دارو مصرف کردم چه کاری باید انجام دهم؟

اگر شما داروی Gabapentin Actavis را بیش از حد استفاده کرده اید، یا اگر کودکی به اشتباه آن را مصرف کرده است باید فوراً با یک پزشک، کارکنان بیمارستان، کارکنان داروخانه یا مرکز اطلاعات سموم (شماره تلفن 112) تماس گرفته و در مورد خطرات احتمالی اطلاعات و نیز مشاوره دریافت کنید.

درصورت فراموش کردن مصرف دارو چه کنم؟

از مصرف کپسول اضافه برای جبران دوز فراموش شده خودداری کنید. اگر نوبتی از دارو را فراموش کرده اید، از پزشکتان در مورد روند ادامه مصرف بپرسید. بسیار اهمیت دارد که چه مدت زمان از آخرین دوز مصرفی گذشته باشد.

Actavis AB, Strandbergsgatan 61, 112 89 Stockholm, tel. 08-13 63 70, info@actavis.se