

برنامه زمانی افزایش (لاموتریژین) Lamotrigin Actavis

Schema för upptrappning av Lamotrigin Actavis

درمان با دوز پایین شروع می شود، که بنا به دستور العملی که از پزشک دریافت میکنید در هفته های بعد به تدریج افزایش می یابد.

تاریخ شروع: روزهای هفته برای تغییر مقدار تجویزی [دوز]:
(Startdatum) (Veckodag för ändring av dos)

افزایش تدریجی

Upptäppning

با پایان یافتن هفته علامت بزنید (Kryssa när veckan är över)	تعداد قرص در هر نوبت (Antal tabletter per tillfälle)	شماره		میلیگرم/قرص (mg/tablett)	هفته (Vecka)
		شب (kväll)	صبح (Morgon)		
<input type="checkbox"/>	7 X روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	1 هفته (Vecka 1)
<input type="checkbox"/>	7 X روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	2 هفته (Vecka 2)
<input type="checkbox"/>	7 X روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	3 هفته (Vecka 3)
<input type="checkbox"/>	7 X روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	4 هفته (Vecka 4)
<input type="checkbox"/>	7 X روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	5 هفته (Vecka 5)
<input type="checkbox"/>	7 X روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	6 هفته (Vecka 6)
<input type="checkbox"/>	7 X روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	7 هفته (Vecka 7)
<input type="checkbox"/>	7 X روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	8 هفته (Vecka 8)

سایر اطلاعات:
(Övrig information)

پزشک من: تلفن:
(Min läkare) (Telefon)

پرستار من: تلفن:
(Min sjuksköterska) (Telefon)

در صورت فراموش کردن مصرف دارو چه کنم؟

از مصرف قرص اضافه برای جبران دوز فراموش شده خودداری کنید. اگر نوبتی از دارو را فراموش کرده اید، از پزشکتان در مورد روند ادامه مصرف پرسید. بسیار اهمیت دارد که چه مدت زمان از آخرین دوز مصرفی گذشته باشد.

اگر بیش از حد دارو مصرف کردم چه کاری باید انجام دهم؟

اگر شما داروی Lamotrigin Actavis را بیش از حد استفاده کرده اید، یا اگر کودکی به اشتباه آن را مصرف کرده است باید فوراً با یک پزشک، کارکنان بیمارستان، کارکنان داروخانه یا مرکز اطلاعات سموم (شماره تلفن 112) تماس گرفته و در مورد خطرات احتمالی اطلاعات و نیز مشاوره دریافت کنید.