

برنامه زمانی افزایش Levetiracetam Actavis (لویتیراسیتام)

Schema för upptrappning av Levetiracetam Actavis

درمان با دوز پایین شروع می شود، که بنا به دستورالعملی که از پزشک دریافت میکنید در هفته ای بعد به تدریج افزایش می یابد.

تاریخ شروع: روزهای هفته برای تغییر مقدار تجویزی [دوز]:
(Startdatum) (Veckodag för ändring av dos)

افزایش تدریجی

Upptäppning

با پایان یافتن هفته علامت بزنید (Kryssa när veckan är över)	تعداد قرص در هر نوبت (Antal tabletter per tillfälle)	شماره		میلیگرم/قرص (mg/tablett)	هفته (Vecka)
		شب (kväll)	صبح (Morgon)		
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	1
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	2
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	3
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	4
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	5
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	6
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	7
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	8

سایر اطلاعات:
(Övrig information)

پزشک من: تلفن:
(Min läkare) (Telefon)

پرستار من: تلفن:
(Min sjuksköterska) (Telefon)

در صورت فراموش کردن مصرف دارو چه کنم؟
اگر یک یا چند نوبت از دوز مصرفی را فراموش کرده اید با پزشک خود تماس بگیرید. از دوبرابر کردن دوز مصرفی برای جبران نوبت فراموش شده خودداری کنید.

اگر بیش از حد دارو مصرف کردم چه کاری باید انجام دهم؟
عوارض جانبی احتمالی مصرف دوز بیش از حد Levetiracetam Actavis شامل خواب آلودگی، آشفتگی، پرخاشگری و کاهش هشیاری می باشد. اگر بیشتر از میزان تجویزی قرص مصرف کرده اید با پزشک خود تماس بگیرید.