

برنامه زمانی افزایش Topiramat Actavis (توپیرامات)

Schema för upptrappning av Topiramat Actavis

درمان با دوز پایین شروع می شود، که بنا به دستور العملی که از پزشک دریافت میکنید در هفته های بعد به تدریج افزایش می یابد.

تاریخ شروع: روزهای هفته برای تغییر مقدار تجویزی [دوز]:
(Startdatum) (Veckodag för ändring av dos)

افزایش تدریجی

Upptäppning

با پایان یافتن هفته علامت بزنید (Kryssa när veckan är över)	تعداد قرص در هر نوبت (Antal tablett per tillfälle)	شماره		میلیگرم/قرص (mg/tablett)	هفته (Vecka)
		شب (kväll)	صبح (Morgon)		
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	1 هفته (Vecka 1)
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	2 هفته (Vecka 2)
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	3 هفته (Vecka 3)
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	4 هفته (Vecka 4)
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	5 هفته (Vecka 5)
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	6 هفته (Vecka 6)
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	7 هفته (Vecka 7)
<input type="checkbox"/>	7 x روز (x 7 dagar)	عدد	عدد	8 هفته (Vecka 8)

سایر اطلاعات:
(Övrig information)

پزشک من: تلفن:
(Min läkare) (Telefon)

پرستار من: تلفن:
(Min sjuksköterska) (Telefon)

در صورت فراموش کردن مصرف دارو چه کنم؟

از مصرف قرص اضافه برای جبران دوز فراموش شده خودداری کنید. اگر نوبتی از دارو را فراموش کرده اید، از پزشکتان در مورد روند ادامه مصرف بپرسید. بسیار اهمیت دارد که چه مدت زمان از آخرین دوز مصرفی گذشته باشد.

اگر بیش از حد دارو مصرف کردم چه کاری باید انجام دهم؟

اگر بیش از حد Topiramat Actavis مصرف کرده اید، فوراً با پزشک یا مراکز پزشکی تماس بگیرید. بسته دارو را همراه خود ببرید. ممکن است بدلیل فشار خون پایین یا ضربان قلب غیرطبیعی یا تشنج، احساس خواب آلودگی یا خستگی کنید، بدنتان حرکات غیر طبیعی داشته باشد یا در ایستادن و راه رفتن مشکل داشته باشید و احساس سرگیجه کنید.