



معلومات المريض جابابينتین أكتافيس لعلاج داء الصرع

معلومات هامة !

- توخّ مزيداً من الحذر عند التداوي بعقار جابابينتین أكتافيس في الحالات الآتية:
- إذا كنت تعاني من الفشل الكلوي أو أي مرض آخر في الكلى.
 - اتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من الديال الدموي أو آلام في العضلات أو ضعف العضلات.
 - اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تعاني من ألم مزمن في البطن أو شعرت بالغثيان والتقيؤ.

كيفية استخدام عقار جابابينتین أكتافيس:



تجنب تناول عقار جابابينتین أكتافيس إلا وفق إرشادات طبيبك. إذا كنت في ريب من كيفية استخدامه، التمس مشورة طبيبك أو الصيدلي. يبدأ التداوي عادةً بجرعة صغيرة ويمكن زيادة هذه الجرعة تدريجياً فيما بعد. قد تستغرق بعض الوقت حتى تتعرف على مقدار الجرعة الأمثل بالنسبة لك. يجب بلع كبسولات جابابينتین أكتافيس تمامًا مع كمية وفيرة من الماء. لا تمضغ الكبسولات. يمكن تناول عقار جابابينتین أكتافيس مع الطعام أو بدونه. تناول دائماً الجرعة الكاملة من الدواء بحسب إرشادات طبيبك. تجنب تناول جزءاً من الكبسولة على الإطلاق.



ما الذي ينبغي عليّ فعله إذا نسيت تناول الدواء؟


تجنب تناول مزيداً من الكبسولات لتعويض الجرعة الفائتة. إذا نسيت تناول الدواء، التمس المشورة من طبيبك حول كيفية استئناف العلاج. وهذا ضروري للغاية إذا انقضى وقتاً طويلاً على الجرعة الأخيرة.

ما المدة التي ينبغي أن يستمر عليها العلاج؟

سيحدد لك طبيبك المدة التي ينبغي أن يستمر عليها علاجك. من الضروري ألا تتوقف عن التداوي دون الاتصال بطبيبك. قد يؤدي التوقف المفاجئ عن التداوي بعقار جابابينتین أكتافيس إلى خطورة زيادة عدد النوبات المرضية. إذا توقف علاجك لأي سبب كان، فعندئذ ينبغي تقليل الجرعة تدريجياً بحسب ما يرد في المذكرة الطبية التي تتلقاها من طبيبك.

ماذا يتعين عليّ فعله إذا تناولت جرعة مفرطة من عقار جابابينتین أكتافيس؟

إذا تناولت جرعة مفرطة من عقار جابابينتین أكتافيس، أو إذا تناول طفل العقار بالخطأ، يتعين عليك الاتصال فوراً بالطبيب أو المشفى أو الصيدلية أو مركز المعلومات والسموم (اتصل برقم 112) لتقييم المخاطر والتماس المشورة.





معلومات المريض

جابابنتين أكتافيس

لعلاج داء الصرع

هل يمكنني تناول الكحول؟

لا توجد قيود محددة فيما يتعلق بتناول الكحول ما خلا التوصيات العامة التي تقضي بتوخي الحذر من تناول جرعات مفرطة من الكحول خاصة إذا كنت تعاني من الصرع.

الحمل والرضاعة

يجب عدم تناول عقار جابابنتين أكتافيس أثناء فترة الحمل ما لم يرشدك طبيبك إلى غير ذلك. لم تُجرى أية دراسات حول تأثير جابابنتين على الخبالي إلا أن التقارير أشارت إلى تأثير أدوية الصرع الأخرى على زيادة مخاطر إيذاء الجنين خاصة إذا تم التداوي بالعديد من هذه الأدوية في الوقت ذاته. ومن ثم، ينبغي على النساء اللاتي يعانين من الصرع تنظيم الحمل حتى يتم ضبط جرعة العلاج ولتقليل مخاطر حدوث تشوه للجنين.



يُفرز عقار جابابنتين أكتافيس في لبن الأم. أما عن أثر العقار على إرضاع الأطفال، فغير معروف حتى الآن. ومن ثم، ينبغي عليكِ دوماً الاتصال بطبيبك قبل استخدام عقار جابابنتين أكتافيس أثناء فترة الرضاعة.

ما هي الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً؟

قد يؤدي عقار جابابنتين أكتافيس كغيره من الأدوية إلى الإصابة بالأعراض الجانبية ولكن ليس بالضرورة أن يصاب جميع من يتداوى به بتلك الأعراض. وتتضمن الأعراض الجانبية التي تعتبر "شائعة للغاية"، وتصيب أكثر من واحد من كل عشرة مرضى كلاً من الخمول أو الدوار أو عدم التناسق إضافة إلى الإصابة بالإرهاق.

لمزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية، انظر النشرة الخاصة بمعلومات المريض داخل هذه العبوة.

هل يمكنني تناول أدوية أخرى؟

قد يتغير تأثير دواء جابابنتين أكتافيس وقد تزداد مخاطر الإصابة بالأعراض الجانبية إذا كنت تتناول بعض الأدوية الأخرى في الوقت ذاته. ويمكنك التعرف عليها من خلال نشرة معلومات المريض داخل العبوة.

كن على اتصال دائم بطبيبك لإخباره بما إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أية أدوية أخرى. وتتضمن تلك الأدوية كلاً من الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية والعلاجات الطبيعية.

هل يمكنني قيادة السيارة؟

قد يؤدي عقار جابابنتين إلى الشعور بالدوار والخمول والإرهاق. ولذلك، يتعين عليك عدم قيادة السيارة أو تشغيل الماكينات المعقدة أو القيام بغير ذلك من الأنشطة الخطرة حتى تتعرف على أثر الدواء على قدرتك على إنجاز مثل هذه الأعمال.

أنت المسؤول عن تحديد ما إذا كانت حالتك تسمح لك بتشغيل موتور السيارة أو القيام بعمل يتطلب منك توخي الحذر. ومع ذلك، تذكر أنك إذا كنت مصاباً بالصرع، فلا يمكنك قيادة السيارة إلا إذا مر عام كامل دون التعرض لنوبات مرضية.

