



معلومات المريض لاموترجين أكتافيس لعلاج داء الصرع

معلومات هامة !

إذا عانيت من أعراض الطفح الجلدي أو الحمى و تورم الوجه أو الأنفلونزا عند بدء التداوي بعقار لاموترجين أكتافيس، فيتعين عليك عندئذ الاتصال بطبيبك على الفور حيث تشير هذه الأعراض في بعض الحالات النادرة إلى الإصابة بالمضاعفات الجانبية. لمزيد من المعلومات، انظر النشرة الخاصة بمعلومات المريض داخل العبوة.

كيفية استخدام عقار لاموترجين أكتافيس:



تجنب تناول عقار لاموترجين أكتافيس إلا وفق إرشادات طبيبك. إذا كنت في ريب من كيفية استخدامه، التمس مشورة طبيبك أو الصيدلي. يبدأ التداوي عادةً بجرعة صغيرة ويمكن زيادة هذه الجرعة تدريجيًا فيما بعد.

قد تستغرق بعض الوقت حتى تتعرف على مقدار الجرعة الأمثل بالنسبة لك. يجب تناول الأقراص كاملة في الوقت ذاته من اليوم. يمكنك تناول عقار لاموترجين أكتافيس مع الطعام أو بدونه. إذا كنت تتناول أقراص قابلة للذوبان، يمكنك بلعها جميعًا مع القليل من الماء أو مضغها أو إذابتها في الماء.

تناول دائمًا الجرعة الكاملة من الدواء بحسب إرشادات طبيبك. تجنب تناول جزءًا من القرص على الإطلاق.



ما الذي ينبغي عليّ فعله إذا نسيت تناول الدواء؟

تجنب تناول مزيداً من الأقراص لتعويض الجرعة الفائتة. إذا نسيت تناول الدواء، التمس المشورة من طبيبك حول كيفية استئناف العلاج. وهذا ضروري للغاية إذا انقضى وقت طويل منذ الجرعة الأخيرة.

ما المدة التي ينبغي أن يستمر عليها العلاج؟

سيحدد لك طبيبك المدة التي ينبغي أن يستمر عليها علاجك. من الضروري ألا تتوقف عن التداوي دون الاتصال بطبيبك. قد يؤدي التوقف المفاجئ عن التداوي بعقار لاموترجين أكتافيس إلى خطورة زيادة عدد النوبات المرضية. إذا توقف علاجك لأي سبب كان، فعندئذ ينبغي تقليل الجرعة تدريجيًا بحسب ما يرد في المذكرة الطبية التي تتلقاها من طبيبك.

ماذا يتعين عليّ فعله إذا تناولت جرعة مفرطة من عقار لاموترجين أكتافيس؟

إذا تناولت جرعة مفرطة من عقار لاموترجين أكتافيس، أو إذا تناول طفل العقار بالخطأ، يتعين عليك الاتصال فورًا بالطبيب أو المشفى أو الصيدلية أو مركز المعلومات والسموم (اتصل برقم 112) لتقييم المخاطر والتماس المشورة.



معلومات المريض لاموترجين أكتافيس لعلاج داء الصرع

الحمل والرضاعة

T قد يتأثر الجنين إذا كنت تتناولين دواء لاموترجين أكتافيس. ومن ثم، كوني على اتصال دائم بطبيبك لالتماس المشورة إذا كنتِ حبلية أو تخططين للحمل خلال فترة التداوي بالعقار. وإذا أصبحتِ حبلية، تجنب التوقف عن التداوي بالعقار دون التماس المشورة أولاً من الطبيب.



قد يتغير مستوى عقار لاموترجين أكتافيس في الدم خلال فترة الحمل. ومن ثم، قد يطلب منك طبيبك إجراء اختبارات الدم على نحو منتظم بغية فحص مستوى عقار لاموترجين أكتافيس ولذلك قد يتغير مقدار الجرعة إذا اقتضى الأمر.

يُفرَز عقار لاموترجين أكتافيس في لبن الأم إلا أن غالبية الأمهات يمكنهن مواصلة إرضاع أطفالهن. بإمكانك التحدث مع طبيبك حول مخاطر التداوي بالعقار خلال فترة الرضاعة ومزاياه.

ما هي الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً؟

قد يؤدي عقار لاموترجين أكتافيس كغيره من الأدوية إلى الإصابة بالأعراض الجانبية ولكن ليس بالضرورة أن يصاب جميع من يتداوى به بتلك الأعراض. وتتضمن الأعراض الجانبية التي تعتبر "شائعة للغاية"، وتصيب أكثر من واحد من كل عشرة مرضى كلاً من الطفح الجلدي أو الصداع أو الدوار أو النعاس أو الخمول أو عدم التناسق إضافة إلى الإصابة بتغيم الرؤية. ويمكن في أغلب الأحيان تجنب الإصابة بهذه الأعراض الجانبية من خلال زيادة تناول الدواء تدريجياً.

لمزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية، انظر النشرة الخاصة بمعلومات المريض داخل هذه العبوة.

هل يمكنني تناول أدوية أخرى؟

قد يتغير تأثير دواء لاموترجين أكتافيس وقد تزداد مخاطر الإصابة بالأعراض الجانبية إذا كنت تتناول بعض الأدوية الأخرى في الوقت ذاته. ويمكنك التعرف عليها من خلال نشرة معلومات المريض داخل العبوة. كن على اتصال دائم بطبيبك لإخباره بما إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أية أدوية أخرى. وتتضمن تلك الأدوية كلاً من الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية، والعلاجات الطبيعية.

هل يمكنني قيادة السيارة؟

قد يؤدي لاموترجين أكتافيس إلى الشعور بالدوار وازدواج الرؤية. ومن ثم، لا تقود السيارة وكذلك لا تقدم على تشغيل الماكينة إذا شعرت بأنك لست على ما يرام. أنت المسؤول عن تحديد ما إذا كانت حالتك تسمح لك بتشغيل موتور السيارة أو القيام بعمل يتطلب منك توخي الحذر. ومع ذلك، تذكر أنك إذا كنت مصاباً بالصرع، فلا يمكنك قيادة السيارة إلا إذا مر عام كامل دون التعرض لنوبات مرضية.



هل يمكنني تناول الكحول؟

لا توجد قيود محددة فيما يتعلق بتناول الكحوليات ما خلا التوصيات العامة التي تقضي بتوخي الحذر من تناول جرعات مفرطة من الكحول خاصةً إذا كنت تعاني من الصرع.

