



معلومات المريض مجموعة ليفيتيراسيتام أكتافيس محلول فموي لعلاج داء الصرع

معلومات هامة !

رُجى الاتصال بالطبيب عند ملاحظة ما يلي:

- تباطؤ نمو الطفل أو بلوغه على نحو غير متوقع.
- زيادة خطورة النوبات المرضية (على سبيل المثال: زيادة عددها).

يحتوي المحلول الفموي ليفيتيراسيتام أكتافيس على باراهيدروكسي بنزوات الميثيل (E218) وباراهيدروكسي بنزوات البروبيل (E216) التي قد تؤدي إلى تفاعلات أرجية (ربما متأخر).

كما يحتوي المحلول الفموي ليفيتيراسيتام أكتافيس على السكر الكحولي؛ ما للتيتول. إذا أخبرك طبيبك بعدم قدرة طفلك/ أطفالك على استساغة بعض أنواع السكر، اتصل بطبيبك قبل تناول هذا الدواء. لمزيد من المعلومات، انظر النشرة الخاصة بمعلومات المريض داخل العبوة.



كيفية استخدام المحلول الفموي ليفيتيراسيتام أكتافيس

تجنب تناول المحلول الفموي ليفيتيراسيتام أكتافيس إلا وفق إرشادات طبيبك. إذا كنت في ريب من كيفية استخدامه، التمس مشورة طبيبك أو الصيدلي. يبدأ التداوي عادةً بجرعة صغيرة ويمكن زيادة هذه الجرعة تدريجياً فيما بعد. قد تستغرق بعض الوقت حتى تتعرف على مقدار الجرعة الأمثل بالنسبة لك.

يمكنك تخفيف المحلول في زجاجة من الماء أو في زجاجات الإرضاع.


ماذا يتعين عليّ فعله إذا تناولت/ تناول طفلي جرعة مفرطة من المحلول الفموي ليفيتيراسيتام أكتافيس؟

من الأعراض الجانبية المحتملة والناجمة عن تناول جرعة مفرطة من المحلول الفموي ليفيتيراسيتام النعاس والهياج والعدوانية وقلّة درجة اليقظة وقلّة القدرة على التنفس والغيوبية. يُرجى الاتصال بطبيبك إذا تناولت أو تناول طفلك من المحلول جرعة أكبر من التي حددها طبيبك. ومن ثمّ، سيقدر طبيبك أفضل علاج للجرعة المفرطة.

ما المدة التي ينبغي أن يستمر عليها العلاج؟

يستخدم المحلول الفموي ليفيتيراسيتام أكتافيس كعلاج على المدى الطويل. يتوجب عليك/ على طفلك مواصلة التداوي بالعلاج للمدة التي يحددها طبيبك.

تجنب التوقف عن التداوي بالعلاج دون التماس المشورة من طبيبك إذ قد يؤدي ذلك إلى زيادة عدد النوبات المرضية. إذا قرر طبيبك أن تتوقف عن تناول الدواء، فسوف تتلقى التعليمات حول كيفية إيقاف العلاج بالمحلول الفموي ليفيتيراسيتام أكتافيس تدريجياً.





معلومات المريض

مجموعة ليفيتيراسيتام أكتافيس

محلول فموي


لعلاج داء الصرع

هل بإمكانني/ بإمكان طفلي تناول أدوية أخرى؟

قد يتغير تأثير المحلول الفموي ليفيتيراسيتام أكتافيس وقد تزداد مخاطر الإصابة بالأعراض الجانبية إذا كنت تتناول/ إذا كان طفلك يتناول بعض الأدوية الأخرى في الوقت ذاته. كن على اتصال دائم بطبيبك لإخباره بما إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أية أدوية أخرى، بما في ذلك الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية.

ما الذي ينبغي عليّ فعله إذا نسيت/ نسى طفلي تناول الدواء؟

اتصل بطبيبك/ بطبيب طفلك إذا نسيت تناول جرعة أو أكثر من الدواء. تجنب تناول جرعتين لتعويض الجرعة الفائتة.



ما هي الأعراض الجانبية الأكثر شيوعًا؟

قد يؤدي عقار ليفيتيراسيتام أكتافيس كغيره من الأدوية إلى الإصابة بأعراض جانبية ولكن ليس بالضرورة أن يصاب جميع من يتداوى به بتلك الأعراض. تتضمن الأعراض الجانبية "الأكثر شيوعًا" والتي تصيب واحدًا فأكثر من كل عشرة كلاً من التهاب الأنف و/ أو الحلق والنعاس والصداع. وقد تكون بعض هذه الأعراض مثل النعاس والإرهاق والدوار أكثر شيوعًا في بداية التداوي أو عند زيادة مقدار الجرعة. ومع ذلك، تقل الأعراض الجانبية بمرور الوقت.

لمزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية، انظر النشرة الخاصة بمعلومات المريض داخل هذه العبوة.

