



معلومات المريض

ليفيتيراسيتام أكتافيس

لعلاج داء الصرع

معلومات هامة !

- رُجى الاتصال بالطبيب أو الصيدلي أو الممرضة قبل تناول ليفيتيراسيتام أكتافيس إذا كنت تعاني من الآتي:
- أعراض العدوانية والإحباط و/ أو الأفكار الانتحارية.
 - أمراض الكلى.
- اتصل بطبيبك إذا لاحظت زيادة خطورة النوبات المرضية (على سبيل المثال: زيادة عدد النوبات المرضية). لمزيد من المعلومات، انظر النشرة الخاصة بمعلومات المريض داخل العبوة.

كيفية استخدام عقار ليفيتيراسيتام أكتافيس:



تجنب تناول عقار ليفيتيراسيتام أكتافيس إلا وفق إرشادات طبيبك. إذا كنت في ريب من كيفية استخدامه، التمس مشورة طبيبك أو الصيدلي. يبدأ التداوي عادةً بجرعة صغيرة ويمكن زيادة هذه الجرعة تدريجياً فيما بعد. قد تستغرق بعض الوقت حتى تتعرف على مقدار الجرعة الأمثل بالنسبة لك. يجب تناول الأقراص كاملة في الوقت ذاته من اليوم. يمكنك تناول عقار ليفيتيراسيتام أكتافيس مع الطعام أو بدونه. ابتلع أقراص ليفيتيراسيتام أكتافيس مع كمية كافية من الماء (على سبيل المثال: كوب ماء)

تناول دائماً الجرعة الكاملة من الدواء بحسب إرشادات طبيبك. تجنب تناول جزءاً من القرص على الإطلاق.



ما الذي ينبغي عليّ فعله إذا نسيت تناول الدواء؟


اتصل بطبيبك إذا نسيت تناول جرعة أو أكثر من الدواء. تجنب تناول جرعتين لتعويض الجرعة الفائتة.

ما المدة التي ينبغي أن يستمر عليها العلاج؟

سيحدد لك طبيبك المدة التي ينبغي أن يستمر عليها علاجك. من الضروري ألا تتوقف عن التداوي دون الاتصال بطبيبك. قد يؤدي التوقف المفاجئ عن التداوي بعقار ليفيتيراسيتام أكتافيس إلى خطورة زيادة عدد النوبات المرضية. إذا توقف علاجك لأي سبب كان، فعندئذ ينبغي تقليل الجرعة تدريجياً بحسب ما يرد في المذكرة الطبية التي تحصل عليها من طبيبك.

ماذا يتعين عليّ فعله إذا تناولت جرعة مفرطة من عقار ليفيتيراسيتام أكتافيس؟

تتضمن الأعراض الجانبية الناتجة عن تناول جرعة مفرطة من ليفيتيراسيتام أكتافيس كلاً من النعاس والهباج والعدوانية وانخفاض درجة اليقظة. يُرجى الاتصال بالطبيب إذا تناولت جرعة أكبر من الجرعة المحددة.





معلومات المريض

ليفيتيراسيتام أكتافيس

لعلاج داء الصرع

هل يمكنني تناول الكحول؟

T لا توجد قيود محددة فيما يتعلق بتناول الكحول ما خلا التوصيات العامة التي تقضي بتوخي الحذر من تناول جرعات مفرطة من الكحول خاصة إذا كنت تعاني من الصرع.

الحمل والرضاعة

أظهرت كبرى الدراسات أنه لا يوجد تأثير على الجنين ولكن التمس دائماً المشورة من طبيبك إذ أن تأثير الدواء على الجنين لا يمكن استبعاده تماماً. وإذا أصبحت حبلية، لا تتوقفين عن التداوي بالعقار دون التماس المشورة أولاً من طبيبك.

قد يتغير مستوى عقار ليفيتيراسيتام أكتافيس في الدم خلال فترة الحمل خاصة قرب نهاية فترة الحمل. ومن ثم، سيطلب منك طبيبك عينات من الدم على نحو منتظم بغية فحص مستوى عقار ليفيتيراسيتام أكتافيس ولذلك قد يتغير مقدار الجرعة إذا اقتضى الأمر.

يُفرز ليفيتيراسيتام في لبن الأم، لذا تحدث مع طبيبك حول مخاطر ومزايا التداوي بالعقار خلال فترة الرضاعة.

ما هي الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً؟

قد يؤدي عقار ليفيتيراسيتام أكتافيس كغيره من الأدوية إلى الإصابة بأعراض جانبية ولكن ليس بالضرورة أن يصاب جميع من يتداوى به بتلك الأعراض. تتضمن الأعراض الجانبية "الأكثر شيوعاً"، والتي تصيب واحدًا فأكثر من كل عشرة كلاً من التهاب الأنف و/ أو الحلق والنعاس والصداع. وقد تكون بعض هذه الأعراض مثل النعاس والإرهاق والدوار أكثر شيوعاً في بداية التداوي أو عند زيادة مقدار الجرعة. ومع ذلك، تقل الأعراض الجانبية بمرور الوقت.

لمزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية، انظر النشرة الخاصة بمعلومات المريض داخل هذه العبوة.

هل يمكنني تناول أدوية أخرى؟

قد تتعرض لبعض المشاكل نادرة الحدوث عند تناول دواء ليفيتيراسيتام مع غيره من الأدوية ولكن حتى لو تعرضت لها، ينبغي عليك إخبار طبيبك بهذه الأدوية التي تتناولها. وتتضمن تلك الأدوية كلاً من الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية والعلاجات الطبيعية.

هل يمكنني قيادة السيارة؟

قد يعوق عقار ليفيتيراسيتام أكتافيس قدرتك على قيادة السيارة أو تشغيل المعدات والماكينات إذ قد يعرضك هذا الدواء إلى الإصابة بالنعاس. تزيد احتمالية حدوث ذلك خلال الفترة الأولى من التداوي بالعقار أو عقب زيادة الجرعة. تجنب قيادة السيارة أو تشغيل



الماكينات قبل التحقق مما إذا كانت قدرتك قد تأثرت. ومع ذلك، تذكر أنك إذا كنت مصاباً بالصرع، فلا يمكنك قيادة السيارة إلا إذا مر عام كامل دون التعرض لنوبات مرضية.

