



# معلومات المريض توبيراميت أكتافيس لعلاج داء الصرع

## معلومات هامة !

- رُجى الاتصال بالطبيب أو الدكتور الصيدلي أو الممرضة قبل تناول توبيراميت أكتافيس إذا كنت تعاني من الآتي:
  - أمراض الكلى خاصةً حصوات الكلى أو الغسيل الكلوي.
  - اضطرابات في الدم أو سوائل الجسم (حمض استقلابي).
  - أمراض الكبد.
  - أمراض الوزن.
  - أمراض العين خاصةً الزرق.
  - أمراض النمو.
  - إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا مرتفع الدهن (نظام غذائي مولد للكيتون).
- تحتوي أقراص توبيراميت أكتافيس 50 مجم و100 مجم و200 مجم المغلفة بالفلم على مادة الليستين (زيت الصويا). تجنب تناول هذا الدواء إذا كنت تعاني من الحساسية تجاه الفول السوداني أو الصويا.



## كيفية استخدام عقار توبيراميت أكتافيس:

تجنب تناول عقار توبيراميت أكتافيس إلا وفق إرشادات طبيبك. إذا كنت في ريب من كيفية استخدامه، التمس مشورة طبيبك أو الطبيب الصيدلي. يبدأ التداوي عادةً بجرعة صغيرة ويمكن زيادة هذه الجرعة تدريجيًا فيما بعد. قد تستغرق بعض الوقت حتى تتعرف على مقدار الجرعة الأمثل بالنسبة لك. يجب تناول عقار توبيراميت أكتافيس كاملاً. تجنب تناول جزءاً من القرص على الإطلاق. تجنب مضغ الأقراص حيث إنها قد تؤدي إلى الشعور بمذاق مر. يمكنك تناول الأقراص قبل أو أثناء أو عقب الوجبة الغذائية. تناول كمية وفيرة من السوائل خلال اليوم لتجنب تكون حصوات الكلى عند تناول عقار توبيراميت أكتافيس.



## ما الذي ينبغي عليّ فعله إذا نسيت تناول الدواء؟

تجنب تناول مزيداً من الأقراص لتعويض الجرعة الفائتة. إذا نسيت تناول الدواء، التمس المشورة من طبيبك حول كيفية استئناف العلاج. وهذا ضروري للغاية إذا انقضى وقت طويل منذ الجرعة الأخيرة.

## ما المدة التي ينبغي أن يستمر عليها العلاج؟

سيحدد طبيبك معك المدة التي ينبغي أن يستمر عليها علاجك. من الضروري ألا تتوقف عن التداوي دون الاتصال بطبيبك. قد يؤدي التوقف المفاجئ عن التداوي بعقار توبيراميت أكتافيس إلى خطورة زيادة عدد النوبات المرضية. إذا توقفت علاجك لأي سبب كان، فعندئذٍ ينبغي تقليل الجرعة تدريجيًا بحسب ما يرد في المذكرة الطبية التي تحصل عليها من طبيبك.

## ماذا يتعين عليّ فعله إذا تناولت جرعة مفرطة من عقار توبيراميت أكتافيس؟

التمس المشورة الطبية على الفور. اصطحب معك علبة الدواء.

قد تشعر بالنعاس أو التعب أو اضطراب الحركات الجسدية أو بعض المشاكل في الوقوف والجلوس والمشي وقد تشعر بالدوار نظرًا لانخفاض ضغط الدم أو اضطراب نبضات القلب أو التشنج.



# معلومات المريض توبيراميت أكتافيس لعلاج داء الصرع

## هل يمكنني تناول الكحول؟

ينبغي عليك توخي الحذر عند تناول الكحوليات لأنها قد تؤدي إلى تقويض أثر دواء توبيراميت أكتافيس. تحدث مع طبيبك حول هذا الأمر.

## الحمل والرضاعة

إذا كنتِ حبلية أو مرضعة، أو كنتِ تتنوين الحمل أو تخططين للحمل، التمس المشورة من طبيبك أو الصيدلي قبل تناول هذا الدواء. سيقرر طبيبك ما إذا كان بإمكانك تناول عقار توبيراميت أكتافيس. كغيره من الأدوية التي تعالج الصرع، هناك خطورة على الجنين إذا تناولت الحبلية هذا الدواء خلال فترة الحمل. تأكد من الفهم التام لمخاطر التداوي بعقار توبيراميت أكتافيس ومزاياه للعلاج من الصرع خلال فترة الحمل.

إذا تناولت دواء توبيراميت أكتافيس أثناء فترة الرضاعة، يجب إخبار طبيبك بأسرع وقت ممكن إذا لاحظتِ أية تغيرات غير طبيعية على طفلك.

## ما هي الأعراض الجانبية الأكثر شيوعاً؟

قد يؤدي عقار توبيراميت أكتافيس كغيره من الأدوية إلى الإصابة بالأعراض الجانبية ولكن ليس بالضرورة أن يصاب جميع من يتداوى به بتلك الأعراض. تتضمن الأعراض الجانبية "الأكثر شيوعاً" والتي تصيب واحدًا فأكثر من كل عشرة كلاً من فقدان الوزن أو الإحساس بوخز في الذراعين والرجلين، أو الخمول أو النعاس والدوار والغثيان والإرهاق والإحباط.

لمزيد من المعلومات حول الأعراض الجانبية، انظر النشرة الخاصة بمعلومات المريض داخل هذه العبوة.

## هل يمكنني تناول أدوية أخرى؟

قد يتغير تأثير دواء توبيراميت أكتافيس وقد تزداد مخاطر الإصابة بالأعراض الجانبية إذا كنت تتناول بعض الأدوية الأخرى في الوقت ذاته. ويمكنك التعرف عليها من خلال نشرة معلومات المريض داخل العبوة.

كن على اتصال دائم بطبيبك لإخباره بما إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخراً أية أدوية أخرى. وتتضمن تلك الأدوية كلاً من الأدوية التي تباع بدون وصفة طبية والعلاجات الطبيعية.

## هل يمكنني قيادة السيارة؟

قد تصاب بدوار وإرهاق ومشكلات في الرؤية أثناء التداوي بعقار توبيراميت أكتافيس. لذا، لا تقود السيارة ولا تقم بتشغيل المعدات أو الماكينات دون مشورة الطبيب. ومع ذلك، تذكر أنك إذا كنت مصاباً بالصرع، فلا يمكنك قيادة السيارة إلا إذا مر عام كامل دون التعرض لنوبات مرضية.

