



اطلاعات بیمار

# Gabapentin Actavis

برای درمان بیماری صرع

## اطلاعات مهم!

در رابطه با Gabapentin Actavis در موارد زیر بیشتر مراقب باشید:

- اگر نارسایی کلیه/مشکلاتی در رابطه با کلیه خود دارید
- اگر دیالیز میکنید و درد عضلانی دارید یا ضعف عضلانیان افزایش یافته است، با پزشک تماس بگیرید
- اگر درد مداوم معده دارید که به تهوع و استفراغ تبدیل شده است، بلافاصله با پزشکتان تماس بگیرید.



## چگونگی استفاده از

### Gabapentin Actavis

همیشه از Gabapentin Actavis همانطور که پزشکتان تجویز کرده است، استفاده کنید. اگر مطمئن نیستید، باید در داروخانه از پزشک یا کارکنان آن مشاوره بگیرید. درمان معمولاً با یک دوز پایین شروع میشود که بعداً به تدریج افزایش پیدا میکند. ممکن است یافتن دوز مناسب شما مدت زمان کوتاهی به طول انجامد. کیسولهای Gabapentin Actavis را باید با مقدار زیادی آب به صورت یکجا مصرف کرد. کیسولها را نجوید. Gabapentin Actavis را میتوان همراه با بدون غذا مصرف کرد.

همیشه تمام دوزی که پزشکتان تجویز کرده است را مصرف کنید. هرگز قسمتی از یک کیسول را مصرف نکنید.



### اگر مصرف دارو را فراموش کنم، چه کاری باید انجام دهم؟


برای جبران دوز فراموش شده، کیسولهای اضافی مصرف نکنید. اگر مصرف داروی خود را فراموش کردهاید، از پزشکتان درباره چگونگی از سرگیری آن مشورت کنید. لازم است که مدت زمان طولانی از دوز آخرتان سپری شده باشد.

### درمان چه مدت باید ادامه پیدا کند؟

پزشکتان همراه با شما تصمیم خواهد گرفت که درمانتان تا چه مدت ادامه پیدا کند. متوقف نکردن درمان بدون تماس با پزشک از اهمیت بسزایی برخوردار است. توقف ناگهانی درمان با Gabapentin Actavis ممکن است به ریسک افزایش تعداد تشنجهای بیانجامد. اگر، به هر دلیلی، درمانتان متوقف شد، دوز را باید مطابق با نسخهای که از پزشکتان دریافت کردهاید، به تدریج کاهش دهید.

### اگر بیش از حد Gabapentin Actavis مصرف کنم، چه کاری باید انجام دهم؟

اگر بیش از حد Gabapentin Actavis مصرف کردهاید، یا اگر کودکی دارو را اشتباهی مصرف کرده است، باید بلافاصله با پزشک، کارکنان بیمارستان، کارکنان داروخانه یا مرکز اطلاعات سمی (به شماره 112) برای مشاوره و ارزیابی ریسکها تماس بگیرید.





# معلومات المريض جابابنتین اکتافیس لعلاج داء الصرع

## میتوانم مشروبات الکلی مصرف کنم؟

هیچگونه محدودیت خاصی در رابطه با مصرف مشروبات الکلی بیش از توصیه عمومی در داشتن احتیاط در مصرف بیش از حد الکل مخصوصاً اگر از بیماری صرع رنج میبرید، وجود ندارد.

## بارداری و شیردهی

Gabapentin Actavis را نباید در طی بارداری مصرف کرد، مگر اینکه پزشکتان مصرف آن را مجاز بدانند. هیچ مطالعاتی به طور خاص گاباپنتین را در زنان باردار مورد بررسی قرار نداده است، اما گزارش شده است که سایر داروهای صرع منجر به افزایش خطر آسیب‌رسانی به جنین مخصوصاً در زمانی شده‌اند که چندین دارو به طور همزمان مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراین، بارداری در زمانی که مبتلا به صرع هستید باید برنامه‌ریزی شده باشد، زیرا میتوان داروهای آنان را تنظیم کرد و خطرات ناهنجاری در جنین را کاهش داد.



Gabapentin Actavis در شیر مادر ترشح میشود. تأثیر آن روی نوزادان شیرخوار مشخص نشده است. بنابراین، باید قبل از استفاده از Gabapentin Actavis در طی دوران شیردهی با پزشک تماس بگیرید.

## متداولترین اثرات جانبی کدامند؟

مانند سایر داروها، Gabapentin Actavis ممکن است منجر به اثرات جانبی شود، اما تمام افرادی که از آن استفاده میکنند از این اثرات جانبی رنج نمیبرند. اثرات جانبی که «بسیار متداول» هستند و در بیش از 1 بیمار از بین 10 بیمار رخ میدهند عبارتند از خواب‌لودگی، سرگیجه، عدم هماهنگی و خستگی.

برای اطلاعات بیشتر پیرامون اثرات جانبی به برگه اطلاعات بیمار موجود در بسته مراجعه کنید.

## آیا میتوانم سایر داروها را مصرف کنم؟

اگر داروهای مشابه خاصی را همزمان با Gabapentin Actavis مصرف کنید ممکن است اثر آن تغییر کند و یا ریسک اثرات جانبی افزایش یابد. تمام این داروها در برگه اطلاعات بیمار موجود در بسته فهرست شده‌اند.

اگر در حال مصرف داروی دیگری هستید یا اخیراً از داروی دیگری استفاده کرده‌اید، حتماً آن را به پزشک اطلاع دهید. این داروها شامل داروهای بدون نسخه و درمانهای متداول نیز میباشد.

## میتوانم رانندگی کنم؟

ممکن است Gabapentin منجر به سرگیجه، خواب‌لودگی و خستگی شود. بنابراین، تا زمانی که نمیدانید آیا این دارو روی توانایی شما در انجام یک سری فعالیتها تأثیر میگذارد، نباید یک وسیله نقلیه را برانید، با ماشینالآت پیچیده کار کنید یا سایر فعالیتهایی که به طور بالقوه خطرناک هستند را انجام دهید.

شما مسئول تعیین این قضیه هستید که آیا در شرایطی هستید که با یک وسیله موتوری کار کنید یا کاری را انجام دهید که باید در آن بسیار هشیار باشید یا خیر. به هر حال، به خاطر داشته باشید زمانی که به بیماری صرع مبتلا هستید، تنها در صورتی مجاز به رانندگی هستید که از آخرین تشنجان یک سال گذشته باشد.

