



اطلاعات بیمار

Lamotrigin Actavis

برای درمان بیماری صرع

اطلاعات مهم!

اگر در زمان شروع درمان با Lamotrigin Actavis، از بثورات پوستی، تب، تورم صورت یا علائم شبیه آنفولانزا رنج میبرید، لازم است بلافاصله با پزشک خود تماس بگیرید، زیرا این علائم در موارد نادر جزو نشانه‌های تأثیرات جانبی به شمار میروند. برای اطلاعات بیشتر، به برگه اطلاعات بیمار موجود در بسته مراجعه کنید.

چگونگی استفاده از Lamotrigin Actavis

همیشه از Lamotrigin Actavis همانطور که پزشکتان تجویز کرده است، استفاده کنید. اگر مطمئن نیستید، باید در داروخانه از پزشک یا کارکنان آن مشاوره بگیرید. درمان معمولاً با یک دوز پایین شروع میشود که ممکن است بعداً به تدریج افزایش پیدا کند.

ممکن است یافتن دوز مناسب شما مدت زمانی به طول انجامد. قرصها باید به صورت یکجا در زمان(های) مشابه در روز مصرف شوند. Lamotrigin Actavis را میتوان همراه یا بدون غذا مصرف کرد. اگر از قرصهای دیسپرس (قابل حل) استفاده میکنید، میتوانید کل آنها را با مقدار کمی آب بخورید، بجوید یا در آب حل کنید.

همیشه تمام دوزی که پزشکتان تجویز کرده است را مصرف کنید. هرگز قسمتی از یک قرص را مصرف نکنید.



اگر مصرف دارو را فراموش کنم، چه کاری باید انجام دهم؟


برای جبران دوز فراموش شده، قرصهای اضافی مصرف نکنید. اگر مصرف داروی خود را فراموش کرده‌اید، از پزشکتان درباره چگونگی از سرگیری آن مشورت کنید. لازم است که مدت زمان طولانی از دوز آخرتان سپری شده باشد.

درمان چه مدت باید ادامه پیدا کند؟

پزشکتان همراه با شما تصمیم خواهد گرفت که درمانتان تا چه مدت ادامه پیدا کند. متوقف نکردن درمان بدون تماس با پزشک از اهمیت بسزایی برخوردار است. توقف ناگهانی درمان با Lamotrigin Actavis ممکن است به ریسک افزایش تعداد تشنجهای بیانجامد. اگر، به هر دلیلی، درمانتان متوقف شد، دوز را باید مطابق با نسخهای که از پزشکتان دریافت کرده‌اید، به تدریج کاهش دهید.

اگر بیش از حد Lamotrigin Actavis مصرف کنم، چه کاری باید انجام دهم؟

اگر بیش از حد Lamotrigin Actavis مصرف کرده‌اید، یا اگر کودکی دارو را اشتباهی مصرف کرده است، باید بلافاصله با پزشک، کارکنان بیمارستان، کارکنان داروخانه یا مرکز اطلاعات سمی (به شماره 112) برای ارزیابی ریسکها و مشاوره تماس بگیرید.





اطلاعات بیمار

Lamotrigin Actavis

برای درمان بیماری صرع



بارداری و شیردهی

ممکن است جنین در طی درمان با Lamotrigin Actavis تحت تأثیر قرار بگیرد. بنابراین، اگر در حین درمان، باردار هستید یا قصد بارداری دارید حتماً پزشک خود را در جریان بگذارید. اگر متوجه شدید که باردار هستید، مصرف دارو را تا زمان مشاوره با پزشک قطع نکنید.

ممکن است سطح Lamotrigin Actavis در خون در طی بارداری تغییر کند. بنابراین، لازم است پزشکتان به صورت منظم برای بررسی سطح Lamotrigin Actavis در خونتان از شما آزمایش بگیرد تا در صورت نیاز دوز دارو را تغییر دهد.

Lamotrigin Actavis در شیر مادر ترشح میشود، اما اکثر زنان میتوانند شیردهی به کودکانشان را ادامه دهند. درباره ریسکها و مزایای شیردهی با پزشکتان صحبت کنید.

متداولترین اثرات جانبی کدامند؟

مانند سایر داروها، Lamotrigin Actavis ممکن است منجر به اثرات جانبی شود، اما تمام افرادی که از آن استفاده میکنند از این اثرات جانبی رنج نمیبرند. اثرات جانبی که «بسیار متداول» هستند و در بیش از 1 بیمار از بین 10 بیمار رخ میدهند عبارتند از: بثورات پوستی، سردرد، سرگیجه، خوابالودگی یا بیحالی، عدم هماهنگی و یا تاری دید. ممکن است این اثرات جانبی با افزایش تدریجی دارو از بین بروند.

برای اطلاعات بیشتر پیرامون اثرات جانبی به برگه اطلاعات بیمار موجود در بسته مراجعه کنید.

آیا میتوانم سایر داروها را مصرف کنم؟

اگر داروهای مشابه خاصی را همزمان با Lamotrigin Actavis مصرف کنید ممکن است اثر آن تغییر کند و یا ریسک اثرات جانبی افزایش یابد. تمام این داروها در برگه اطلاعات بیمار موجود در بسته فهرست شدهاند.

اگر در حال مصرف داروی دیگری هستید یا اخیراً از داروی دیگری استفاده کردهاید، حتماً آن را به پزشک اطلاع دهید. این داروها شامل داروهای بدون نسخه و درمانهای متداول نیز میباشدند.

میتوانم رانندگی کنم؟



ممکن است Lamotrigin Actavis باعث ایجاد بیحالی یا دوبینی شود. بنابراین، اگر حالتان خوب نیست، از راندن وسیله نقلیه یا کار با ماشینآلات دوری کنید. شما مسئول تعیین این قضیه هستید که آیا در شرایطی هستید که با یک وسیله موتوری کار کنید یا کاری را انجام دهید که باید در آن بسیار هشیار باشید یا خیر. به هر حال، به خاطر داشته باشید زمانی که به بیماری صرع مبتلا هستید، تنها در صورتی مجاز به رانندگی هستید که از آخرین تشنجتان یک سال گذشته باشد.

میتوانم مشروبات الکلی مصرف کنم؟

هیچگونه محدودیت خاصی در رابطه با مصرف مشروبات الکلی بیش از توصیه عمومی در داشتن احتیاط در مصرف بیش از حد الکل مخصوصاً اگر از بیماری صرع رنج میبرید، وجود ندارد.



.....

.....

.....

.....

