



اطلاعات بیمار

Levetiracetam Actavis Group

محلول خوراکی

برای درمان بیماری صرع

اطلاعات مهم!

در صورت مشاهده موارد زیر با پزشک تماس بگیرید:

- رشد کودکان کند شده است یا فرآیند بلوغ به صورت غیرمنتظره پیش می‌رود
- تشنجه‌ها جدی‌تر شده‌اند (به عنوان مثال، افزایش تعداد تشنجه‌ها)

محلول خوراکی Levetiracetam Actavis حاوی متیل پاراهیدروکسی بنزات (E218) و پروپیل پاراهیدروکسی بنزات (E216) است که ممکن است منجر به واکنش‌های آلرژیک (احتمالاً به تأخیر افتاده) شود. محلول خوراکی Levetiracetam Actavis نیز حاوی مالتیتول است. اگر پزشکتان به شما گفته است که شما/کودکتان قادر به تحمل مواد قندی خاصی نیستید، قبل از استفاده از این دارو با پزشکتان تماس بگیرید. برای اطلاعات بیشتر، به برگه اطلاعات بیمار موجود در بسته مراجعه کنید.

چگونگی استفاده از محلول خوراکی Levetiracetam Actavis

همیشه از محلول خوراکی Levetiracetam Actavis همانطور که پزشکتان تجویز کرده است، استفاده کنید. اگر مطمئن نیستید، باید در داروخانه از پزشک یا کارکنان آن مشاوری بگیرید. درمان معمولاً با یک دوز پایین شروع می‌شود که بعداً به تدریج افزایش پیدا می‌کند. ممکن است یافتن دوز مناسب شما مدت زمان کوتاهی به طول انجامد.

محلول را میتوان در یک لیوان آب یا در شیشه شیر کودک رقیق کرد.




اگر من/کودکم بیش از حد از محلول خوراکی Gabapentin Actavis مصرف کنیم، چه کاری باید انجام دهیم؟

اثرات جانبی احتمالی در زمان استفاده بیش از حد از محلول خوراکی Levetiracetam Actavis عبارتند از خواب‌آلودگی، بیقراری، پرخاشگری، کاهش هوشیاری، تنگی تنفس و کما. اگر شما/کودکتان بیش از حد تجویز شده توسط پزشکتان از محلول خوراکی استفاده کرده‌اید، با پزشکتان تماس بگیرید. پزشکتان درباره بهترین درمان برای استفاده بیش از حد از دارو تصمیم خواهد گرفت.

درمان چه مدت باید ادامه پیدا کند؟

محلول خوراکی Levetiracetam Actavis به عنوان یک درمان بلندمدت مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما/کودکتان باید تا زمانی که پزشکتان تجویز میکند به استفاده از این دارو ادامه دهید.

بدون مشورت با پزشک درمان را متوقف نکنید، زیرا ممکن است منجر به افزایش تعداد تشنجه‌ها شود. اگر پزشکتان تصمیم بگیرد که درمان را متوقف کند، دستورالعملی برای چگونگی توقف تدریجی درمانتان با محلول خوراکی Levetiracetam Actavis دریافت خواهید کرد.





Levetiracetam Actavis Group

اطلاعات بیمار

محلول خوراکی

برای درمان بیماری صرع

آیا من/کودکم میتوانیم سایر داروها را مصرف کنیم؟

اگر شما/کودکتان داروهای مشابه خاصی را همزمان با محلول خوراکی Levetiracetam Actavis مصرف کنید ممکن است اثر آن تغییر کند و یا ریسک اثرات جانبی افزایش یابد. اگر شما/کودکتان در حال مصرف داروی دیگری هستید یا اخیراً از داروی دیگری استفاده کرده‌اید، حتماً آن را به پزشک اطلاع دهید. این داروها شامل داروهای بدون نسخه هستند.

اگر من/کودکم مصرف دارو را فراموش کنیم، چه کاری باید انجام دهیم؟

اگر یکی یا بیش از یکی از دوزهای دارو را فراموش کردید، با پزشک خود/پزشک کودکتان تماس بگیرید. برای جبران دوز فراموش شده، دو برابر دوز تجویز شده را مصرف نکنید.



متداولترین اثرات جانبی کدامند؟

مانند سایر داروها، ممکن است این دارو منجر به اثرات جانبی شود، اما تمام افرادی که از آن استفاده میکنند از این اثرات جانبی رنج نمیبرند. اثرات جانبی «بسیار متداول» که در بیش از 1 بیمار از بین 10 بیمار روی میدهد عبارتند از التهاب بینی و/یا گلو، سردرد و خوابالودگی. ممکن است برخی از اثرات جانبی مانند خوابالودگی، خستگی و سرگیجه در شروع درمان یا در زمان افزایش دوز دارو، متداولتر باشند. به هر حال، اثرات جانبی باید در طی گذر زمان کاهش پیدا کنند.

برای اطلاعات بیشتر پیرامون اثرات جانبی به برگه اطلاعات بیمار موجود در بسته مراجعه کنید.



.....

.....

.....

.....

